

מורים יקרים

לפניכם בחינת מתכונת ארכימדס למועד קיץ 2021 שאלון 581 לשימוש כבחינה בלבד על ידי מורים.
אנא הקפידו **שלא להעביר את הבחינה בתפוצה שכוללת תלמידים ולא לפטור אותה איתם.**

בדומה לספרי ההכנה של ארכימדס לבגרות, המתכונת מכוונת ל"יוטר חשיבה ופחות חישובים" ומנסה להתחזות ככל הניתן אחרי סגנון בחינות הבגרות האחרונות. ספרי ההכנה של ארכימדס כוללים עשרות בחינות מתכונת - חלקן עם פתרון מלא כולל הדרך - ומהווים כלי מצוין להכנה לבחינות הבגרות.

לקראת מועד הבגרות, ניתן להפנות את התלמידים :

- **לרכישת עותק דיגיטלי מוזל של ספרי ההכנה לבגרות של ארכימדס באתר Classoos** בקישור : <https://my.classoos.com/il/search/store/ארכימדס> (זמן מהמתאפשר רק מחשב, לא מסולארי)
- **הזמןה מרכז לבית הספר** (או לבית המורה) ניתן לבצע בטלפון : 052-2285566 או לפנות**archimedes100@gmail.com**
- **ניתן להזמין ספר הביתה עם שליח** באתר ארכימדס בקישור : <https://bit.ly/3ndOdNg>

בצלחה!

שאלון 581 - מתכונת למועד קיץ 2021

לפניך שאלון ה כולל 8 שאלות. בחר 4 שאלות מתוכן וענה עליהם (לכל שאלה 25 נק')

פרק ראשון - אלגברה והסתברות


1. הנקודות A, B, C ו-D ממוקמות כמתואר בشرطוט. נתון: $AC \perp BD$, $AC = 32$, $BD = 24$.
ב-00: יצא נשר מהנקודה B והחל לעוף במהירות קבועה לנקודה D.
ב-00:11: יצא חסידה מהנקודה A והחל לעוף לנקודה C במהירות קבועה
שהייתה גבוהה פי 2 ממהירות הנשר. **ב-00:14:** עבר הנשר ל-4.5 שניות מנוחה.
כשחידש את מעופו, החלה מנשבת רוח במהירות 2 קמ"ש מהנקודה B לנקודה D.
בשעה 00:13: היה המרחק בין השניים שווה למרחק ביניהם בשעה 00:21, כאשר
נפסקה הרוח. החסידה עברה בנקודה B מתיישבו בין השעות 00:13 ו-00:21.
א. חשב את מהירות המעוף של הנשר ושל החסידה (המהירותים במספרים שלמים).
ב. נתון ששבועה 30:21 השניים הגיעו ליעדם. הנשר הסתובב מיד והחל חזרה לנקודה B. החסידה נחה
בנקודה C זמן מה, ואז החלה במעוף בחזרה לנקודה A. מרגע שהחלו במעוף חזרה, הנשר הגביר את
מהירותו באחוז מסויים והחסידה הפיכתה מהירותה **באותואחוז** כך שהגיעו יחד לנקודה B. שעה
לפני שנפגשו, כאשר שניים במעופם, היה המרחק מהנשר ועד לנקודה B גדול פי 1.5 מהמרחק
מהחסידה ועד לנקודה B.
1. מצא באיזו שעה נפגשו הנשר והחסידה.
2. חשב מה היה משך המנוחה של החסידה לפני שהחלה במעוף חזרה לנקודה B.
2. בסדרה החשבונית a_n יש 3 איברים ($n > 1$). האיבר הראשון בסדרה הוא a_1 וההפרש d .
סכום כל האיברים **האחורוניים** בסדרה שווה לסכום 2 האיברים האחרים בה.
א. לפניך שתי טענות. עבור כל טענה קבע האם היא נכונה או שגויה:
.i. אם הסדרה a_n יורדת אז כל איבריה שליליים.
.ii. אם בסדרה a_n מספר זוגי של איברים אז יתכן שסכום כל האיברים הראשונים הוא זוגי.
ב. נתון שסכום כל האיברים הראשונים בסדרה הוא שלילי. קבע איזו מהטענות הבאות היא נכונה:
 $a_1 > d$.iii $a_1 = d$.ii $a_1 < d$.i
ג. יוצרים סדרה חדשה b_n המוגדרת כך: $b_n = |a_n| - 5$. נתון שבכל אחת מהסדרות a_n ו- b_n יש 9 איברים. נתון שסכום הסדרה b_n הוא 117. מצא את d וחשב את סכום הסדרה a_n .

3. בשק א' יש 4 פלפלים יroxים ו-2 פלפלים צחובים. בשק ב' יש 3 פלפלים יroxים ו-3 פלפלים צחובים. אנטון מטיל קובייה הוגנת. אם מתקבלת אחת מהספרות 1 או 2, הוא מוציא באקראי פלפל משק א'. אם מתקבלת הספרה 3, הוא מוציא באקראי פלפל משק ב'.
- אם מתקבלת ספרה אחרת, הוא בוחר באקראי אחד מהשകים ומוציא ממנו פלפל.
- א. קבוע איזה פלפל - יrox או צחוב - סביר יותר שאנטון יוציא. נמק את תשובהך.
- ב. אנטון החזיר את הפלפל שהוציא לשק שמננו הוצאה, החזיר פלפל לפי הכלל שתואר, החזיר לשק ממנו הוצאה ושוב הוציא וכך המשיך. אנטון חזר על התהליך 5 פעמים. ידוע שבחalk מההוצאות יצא פלפל יrox ובחalkן יצא פלפל צחוב. חשב את ההסתברות שאנטון הוציא פלפל צחוב רק פעמיים.
- ג. אנטון החזיר את הפלpel שהוציא לשק שמננו הוצאה. כעת לך קובייה חדשה שאינה הוגנת. בקוביה זו, ההסתברות לקבל את הספרה 3 זהה להסתברות שהיתה לו היותה הקובייה הוגנת.
- קבוע איזו מהטענות הבאות נכונה לגבי הפלpel שיוציא אחורי הטלת **הקוביה החדשה**. נמק:
- i. ניתן לקבוע כי סביר יותר שאנטון יוציא פלפל צחוב.
 - ii. לא ניתן לדעת אם סביר יותר להוציא פלפל יrox או צחוב.
 - iii. ניתן לקבוע כי סביר יותר שאנטון יוציא פלפל יrox.

פרק שני - גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

4. א. הוכח את המשפט: "במשולשים דומים היחס בין חוצי זווית מותאמות שווה ליחס הדמיון".
- ב. במשולש ישר הזווית $\triangle ABC$ שלפניך הקטע BD הוא הגובה ליתר.

הוכח: $\triangle ABD \sim \triangle ABC$




ג. הקטעים DE ו- MF הם חוצי זווית במשולשים $\triangle BCD$ ו- $\triangle ABD$ בהתאם. הוכח:

$$\frac{BC}{AB} = \frac{ME}{MF}$$

ד. לפניך שתי טענות. עבר כל טענה קבע האם היא נכונה או שגوية. נמק את תשובהך:

- i. ניתן לחסום את המרובע $BEDF$ במעגל.
- ii. הקטע BD ארוך יותר מהקטע EF .

5. הנקודה D נמצאת בתחום המשולש ΔABC כך שהקטע AD חוצה את הזווית $\angle BAC$.



$$\text{נתון: } \angle BAD = \alpha, AB = 2AD, AC = 4AD.$$

א. הבע באמצעות $\cos \alpha$ את יחס שטחיו המשולשים:

$$\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta ABD}}.$$

$$\text{ב. נתון: } m = BD, BC = 3m.$$


נתון שיחס השטחים שמצוין בסעיף א' גדול מ-3.

1. מצא את α .

2. המשולש ΔABC חסום במעגל. הבע באמצעות m את אורך הקשת הקצרה BC .

פרק שלישי - חישוב דיפרנציאלי ואנטגרלי של פולינומים, פונקציות שורש, פונקציות

רציונליות ופונקציות טרייגונומטריות



6. נתון גרף הפונקציה $(x)f$ המוגדרת לכל x .





$$\text{מגדירים את הפונקציה } g(x) = \int_0^x f(t) dt \text{ בתחום: } x \leq 0.$$

א. מצא את תחום העליה והירידה של הפונקציה $(x)g$ בתחום: $x \leq 0$.

ב. קבע האם לפונקציה $(x)g$ יש אסימפטוטה אופקית. נמק.

ג. נתון שהשטח הכלוא בין גרף $(x)f$ לבין ציר ה- x גדול מהשטח הכלוא בין גרף $(x)g$ לבין הצירים.

קבע איזה מהגרפים הבאים עשוי להיות גרף $(x)g$:



$$\text{ד. נתון: } f(x) = \frac{24x}{x^2 - 2x + 4}. \text{ עבור הפונקציה } (x)g: f(x) =$$

1. מצא את שיעורי נקודות הקיצון A ו-B וקבע את סוגן.

2. מצא את האסימפטוטה האופקית.


3. קבע כמה פתרונות יש למשוואה: $f(x) = g(x)$. נמק את תשובתך.

$$\text{ה. נתונה הפונקציה: } h(x) = \sqrt{|f(x)|}.$$

1. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $(x)h$.

2. קבע האם לפונקציה $(x)h$ יש אסימפטוטות. נמק את תשובתך.

3. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $(x)h$ וקבע את סוגן.



7. לפניך גраф הפונקציה: $f(x) = \frac{8}{(x-5)^2}$.

א. מצא את האסימפטוטות המקבילות לציריים.

ב. הנקודה $B(t, y_B)$ נמצאת על גраф הפונקציה $(x)f$.

נתון: $5 < t < 0$. הישר $y = y_B$ חותך את גраф הפונקציה $(x)f$ בנקודות B ו- C . הקטע BC הוא צלע במלבן שאחת מצלעוותיו נמצאת על ציר ה- x .

1. הבע באמצעות t את שיעור ה- x של הנקודה C .

2. מצא את t שבו היקף המלבן הוא מינימלי.

ג. נתון: היקף המלבן הוא 12 יח'.

חשב את השטח המוגבל בין הצלע השמאלית של המלבן לבין גраф הפונקציה $(x)f$ והציריים.

ד. נתונה הפונקציה $(x)f \cdot (x-9) = g(x)$ (x טבעי) שהגרף שלה חותך את ציר ה- y מעל ראשית הציריים.

1. מצא את טווח ערכי t האפשריים לפי הנתון.

2. כאשר היקף המלבן מינימלי, מצא את טווח הערכים האפשריים של השטח המוגבל בין הישר $t = x$ לבין גраф הפונקציה $(x)g$ והציריים.

8. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x}{\cos^2 x}$ בתחום: $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$.

א. עבור הפונקציה $(x)f$ מצא בתחום הנתון את:

1. האסימפטוטות האנכיות.

2. שיעור נקודת החיתוך עם הציריים.

3. תחומי החיוויות והשליליות.

ב. נתון שלמשוואת $0 = f(x)$ יש פתרון אחד בתחום הנתון. היעזר בסעיפים הקודמים וambilי לגזור את

הfonקציה $(x)f$, קבע כמה נקודות קיצון יש לה בתחום הנתון וקבע את סוגן.

ג. שרטט סקיצה של גраф הפונקציה $(x)f$ בתחום הנתון.

ד. נתונה הפונקציה $g(x) = \frac{x}{\sin^2 x}$ בתחום: $\pi \leq x \leq 0$. הישר המשיק לגרף הפונקציה $(x)f$ בראשית

הציריים משיק לגרף הפונקציה $(x)g$ בנקודה A , הנמצאת בתחום: $\pi \leq x \leq 0$. מצא את שיעורי A .

ה. נתונה הפונקציה: $h(x) = g(x) - f(x)$ בתחום: $-\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$. הנקודה A היא קדקוד במעוין שאיכסונו נחתכים בראשית הציריים. אחד מקודודי המעוין נמצא בנקודת החשכה של אלכסון המעוין לגרף

הfonקציה $(x)h$ בربיע השני.ambilי לגזור את הפונקציה $(x)h$ קבע האם יתכן שמעוין זה הוא ריבוע. אם כן, חשב את היקפו. אם לא, הסבר מדוע.

תשובות:

(1) א. מהירות הנשר 2 קמ"ש, מהירות החסידה 4 קמ"ש. ב. 1. 30:05 בבוקר. 2. שלוש שעות.

(2) א. נכונה. ב. נכונה. ג. $d = -3$, $S = -162$.

(3) א. ההסתברות להוציא פלפל ירוק ($\frac{29}{72}$) גבוהה מההסתברות להוציא פלפל צהוב ($\frac{43}{72}$). ב. 0.378. ג. iii.

(4) ד. נכונה. ב. שגوية.

(5) א. $\alpha = 41.41^\circ$. ב. 1. $8 \cos \alpha$. ג. 1. $4.37m$.

(6) א. עלייה: $x < 4$; ירידה: $x > 4$ או $1 < x < 0$. ב. אין אסימפטוטה אופקית. ג. גרף I.


. $y = \sqrt{8}$. ב. 3. שלושה. ג. 1. כל x. ד. $y = -8$. א. $\min(-2, -12), \max(2, 4)$.

. $\max(-2, \sqrt{12}), \min(1, 0), \max(2, 2), \min(4, 0)$.

(7) א. $2.4 \leq S \leq 19.2$. ב. 1. $1 \leq n \leq 8$. ג. 2.4 יחס'ר. ד. 1. $t=3$. א. $-t+10$. ב. 1. $y=0, x=5$.

. $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ או $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$. 3. חיוביות: $0 < x < \frac{\pi}{2}$. שליליות: $0 < x < \frac{3\pi}{2}$. א. 1.

. $A(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. ב. נקודות מינימום אחת. ג.



ה. ניתן שהמעוין הוא ריבוע. אם הוא ריבוע היקפו π^4 יחס'.